



新型コロナワクチン

3回目接種が本格化しています



現在、医療従事者や高齢者施設入所者・従事者へ3回目接種を行っています。また、65歳以上の高齢者については、6月30日までに2回目接種を終えた人へ接種券を発送済みです。接種券の発送状況については、市ホームページ（右上QRコード）から確認できます。

2月・3月に国から供給されるワクチンは、ファイザー社が4割、武田／モデルナ社が6割となっており、希望するワクチンによってはすぐに接種できない場合があります。また、接種体制やワクチン供給量の関係などから、接種医療機関・接種可能日などに限りがありますのでご了承ください。

●問＝新型コロナウイルスワクチン接種推進室 Tel 24-5007

3回目接種の安全性と効果は？

3回目接種では1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社か武田／モデルナ社のワクチンを使用します。

厚生労働省によれば、どちらのワクチンも、3回目接種後の7日以内の副反応は、一部の症状の出現率に差があるものの1・2回目接種とおおむね同様の症状が見られました。

安全性

発現割合	ファイザー社 3回目接種後の症状	武田／モデルナ社 3回目接種後の症状
50%以上	疼痛 (83.0%) 疲労 (63.7%)	疼痛 (83.8%) 疲労 (58.7%) 頭痛 (55.1%)
10～50%	頭痛 (48.1%) 筋肉痛 (39.1%) 悪寒 (29.1%) 関節痛 (25.3%)	筋肉痛 (49.1%) 関節痛 (41.3%) 悪寒 (35.3%) リンパ節症 (20.4%)
1～10%	38度以上の発熱 (8.7%) 腫脹 (8.0%) 発赤 (5.9%) リンパ節症 (5.2%)	38度以上の発熱 (6.6%) 腫脹・硬結 (5.4%) 紅斑・発赤 (4.8%)

効果

3回目接種をした人はしていない人に比べて、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

1・2回目と違うワクチンを接種した場合の安全性と効果は？

イギリスで、2回目接種から12週以上経過したあとにさまざまなワクチンを使って3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容できると報告されています。

効果

1・2回目にファイザー社ワクチンの接種を受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンの接種を受けた場合と、武田／モデルナ社ワクチンの接種を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇しました。

ワクチンの組み合わせ			抗体価
● ファイザー	→	● ファイザー	↑ 上昇
● ファイザー	→	● ファイザー	
● ファイザー	→	● ファイザー	

※厚生労働省「追加（3回目）接種に使用するワクチンについてのお知らせ」から作成